

入院治療計画書 心臓カテーテル検査(CAG)・経皮的冠動脈形成術(PCI)を受けられる方へ

患者様用(下肢用)

患者氏名

様

受持看護師:

| 日時 | / | | / | | / | | | / | |
|------------------------------|--|---|---|---|----------------|------------------------------------|--|--|--|
| 経過 | 入院 | 検査前日 | 検査当日検査前 | 当日検査直後 | 検査後1時間 | 圧迫解除 | 安静解除 | 翌日 | / |
| 達成目標 | ◇心臓カテーテル検査の必要性を理解し同意している ◇不安が最小限の状態検査が迎えられる | | | ◇血圧・脈拍が安定している ◇傷口の出血が少ない ◇傷口の疼痛がフェイススケール2以下である | | | ◇退院後の生活への不安が最小限である ◇内服服用の必要性が理解できる ◇栄養指導が理解できる | | |
| 治療・薬剤(点滴・内服)処置 | | 眠剤があります 看護師が寝る前に渡します いつも飲んでいて眠剤がある場合そちらを飲んでください | 検査前に安定剤を内服します 病衣に着替えます 検査予定時間は()です お薬は中止説明がない場合、いつも通り飲んでください | 持続点滴があります 看護師が血圧・脈拍の測定、傷口の観察などをします | 内服はいつも通飲んでください | 医師が圧迫を外します | 看護師が傷口から出血がないか再度確認をします | 看護師が傷口のガーゼを交換します |  |
| 検査 | | 24時間心電図の検査があります | | | | | | | |
| 活動・安静度 | 主治医の指示で安静度がきまります | | 看護師とともに「歩いて・車椅子」で、心臓カテーテル検査室へ行きます | ベッド上安静です 足を曲げること、頭を上げること、寝返りをうつことは出血を招きます 避けてください | | 圧迫解除時、出血がなければ、看護師の介助のもと横を向くことができます | 安静解除後、歩行確認を行い出血がないことを確認後、指示内で歩行可となります | | |
| 食事 | 治療食になります | | (朝食・昼食)が(絶食・半量)になります 水分はとれます  | 寝たままですが食事ができます  | | | 普段と同じように座って食事ができます | | |
| 清潔 | 主治医の指示範囲内で、シャワー及び全身清拭が可能です | 陰部周囲、太もも除毛後に保清してもらいます | 義歯・指輪・ヘアピン等の装飾品をはずして下さい 化粧・マニキュアは落としておいて下さい | | | | 安静解除後、消毒液で汚れた部位をふきます | 検査部位に問題がなければ入浴できます |  |
| 排泄 | | | 検査30分前位に尿の管を入れます 陰部はガーゼで保護します | | | | 尿の管が抜けます | | |
| 患者様及びご家族への説明 栄養指導 服薬指導 | 担当医が入院治療計画・検査の説明と看護師から入院生活の説明があります | | | | | | 医師より退院の許可がでた方は翌日退院退院までに心臓カテーテル検査の結果説明があります 薬剤師が訪室し薬についての説明があります | 看護師から退院後の生活についての説明があります 薬剤師から薬についての説明があります 栄養士から食事療法についての説明があります | |

診療計画・入院期間については現時点での予定です。場合によっては変わることがあります。