

レジメン名：XELOX(Capecitabine+L-OHP)+Pmab 療法

催吐リスク：中等度

処方：1クール 3週間

〈点滴〉 末梢静脈

Day1

- | | | | |
|----------------|----------------------|--------|-----------------------|
| ① 生食 | 100mL | | |
| デキサメタゾン | 9.9mg | | |
| グラニセトロン | 3mg | 30分 | |
| ② 生食 | mL | | |
| パニツムマブ(パネキセキス) | 6mg/kg | 1時間 | |
| | | | 全量 100mL となるように生食を加える |
| ③ 5%ブドウ糖 | 250mL | | |
| オキサリプラチン | 130mg/m ² | 2時間 | |
| ④ 生食 | 50mL | フラッシュ用 | 10分くらい |

〈点滴〉 Vポート静脈内抗癌剤持続注入

Day1

- | | | | |
|----------------|----------------------|-----|-----------------------|
| ① 生食 | 20mL | 1本 | 穿刺用 |
| ② 生食 | 100mL | | |
| デキサメタゾン | 9.9mg | | |
| グラニセトロン | 3mg | 30分 | |
| ③ 生食 | mL | | |
| パニツムマブ(パネキセキス) | 6mg/kg | 1時間 | |
| | | | 全量 100mL となるように生食を加える |
| ④ 5%ブドウ糖 | 250mL | | |
| オキサリプラチン | 130mg/m ² | 2時間 | |
| ⑤ 生食 | 20mL | 1本 | 抜針用 |

〈内服〉

Day1-14

- | | | | |
|---------------|-----------------------|------|--------------------|
| ① カペシタピン(セロガ) | 2000mg/m ² | 分2朝夕 | 14日間 |
| | | | Day1 夕-Day15 朝 内服 |
| | | | Day15 夕-Day22 朝 休薬 |

Day2・3

- | | | | |
|----------------|-----|------|--|
| ② デキサメタゾン(デカド) | 8mg | 分2朝昼 | |
|----------------|-----|------|--|