

レジメン名：FEC75療法

乳がん

催吐リスク：高度

処方：1クール 3週間

<点滴>

Day1

- | | | | |
|----------------|----------------------|--------|--------|
| ① 生食 | 50mL | | |
| デキサメタゾン (デカト) | 9.9mg | | |
| パロノセトロン(アキ) | 0.75mg | 15分 | |
| ② 生食 | 50mL | | |
| エピルピシン | 75mg/m ² | 15分 | |
| ③ 生食 | 100mL | | |
| シクロホスファミド(イトキ) | 600mg/m ² | 30分 | |
| ④ 生食 | 100mL | | |
| 5-FU | 500mg/m ² | 30分 | |
| ⑤ 生食 | 50mL | フラッシュ用 | 10分ぐらい |

<内服>

Day1

- | | | |
|----------------|-------|----------------|
| ① アプレピタント (イト) | 125mg | 抗がん剤投与 60-90分前 |
|----------------|-------|----------------|

Day2-3

- | | | |
|----------------|------|-----|
| ② アプレピタント (イト) | 80mg | 分1朝 |
|----------------|------|-----|

Day2-4

- | | | |
|-----------------|-----|------|
| ③ デキサメタゾン (デカト) | 8mg | 分2朝昼 |
|-----------------|-----|------|