

レジメン名：FOLFIRI (5-FU+I-LV+CPT-11) +Pmab 療法 大腸がん

催吐リスク：中等度

処方：1クール 2週間

<点滴> Vポート静脈内抗癌剤持続注入

Day1

- | | | | | |
|---|-----------------|-----------------------|------|-------------------------------|
| ① | 生食 | 20mL | 1本 | 穿刺用 |
| ② | 生食 | 100mL | | |
| | デキサメタゾン (デキサート) | 6.6mg | | |
| | グラニセトロン | 3mg | 30分 | |
| ③ | 生食 | mL | | |
| | パニツムマブ (パキタキス) | 6mg/kg | 60分 | |
| | | | | 全量 100mL となるように生食を加える |
| ④ | 生食 | 250mL | | |
| | イリノテカン (カプト) | 150mg/m ² | 90分 | |
| | 生食 | 250mL | | |
| | レボホリナート | 200mg/m ² | 2時間 | 側管 or ルート 2
同時投与 |
| ⑤ | 生食 | 50mL | | |
| | 5-FU | 400mg/m ² | | 側管から全開で (5分ぐらい) |
| ⑥ | 生食 | mL* | | |
| | 5-FU | 2400mg/m ² | 46時間 | (インフューザーポンプ) |
| | | | | *インフューザーポンプの容量に合わせて必要量の生食を加える |
| ⑦ | 生食 | 20mL | 1本 | 抜針用 |