

レジメン名：FOLFOX（5-FU+I-LV+L-OHP）+Pmab療法 大腸がん

催吐リスク：中等度

処方：1クール 2週間

<点滴> Vポート静脈内抗癌剤持続注入

Day1

- |   |                  |                       |      |                               |
|---|------------------|-----------------------|------|-------------------------------|
| ① | 生食               | 20mL                  | 1本   | 穿刺用                           |
| ② | 生食               | 100mL                 |      |                               |
|   | デキサメタゾン（デキサート）   | 6.6mg                 |      |                               |
|   | グラニセトロン          | 3mg                   | 30分  |                               |
| ③ | 生食               | mL                    |      |                               |
|   | パニツムマブ（パキタキス）    | 6mg/kg                | 60分  |                               |
|   |                  |                       |      | 全量 100mL となるように生食を加える         |
| ④ | 5%ブドウ糖液          | 250mL                 |      |                               |
|   | オキサリプラチン（エルプラット） | 85mg/m <sup>2</sup>   | 2時間  |                               |
|   | 生食               | 250mL                 |      |                               |
|   | レボホリナート          | 200mg/m <sup>2</sup>  | 2時間  | 側管 or ルート 2<br>同時投与           |
| ⑤ | 生食               | 50mL                  |      |                               |
|   | 5-FU             | 400mg/m <sup>2</sup>  |      | 側管から全開で（5分ぐらい）                |
| ⑥ | 生食               | mL*                   |      |                               |
|   | 5-FU             | 2400mg/m <sup>2</sup> | 46時間 | （インフューザーポンプ）                  |
|   |                  |                       |      | *インフューザーポンプの容量に合わせて必要量の生食を加える |
| ⑦ | 生食               | 20mL                  | 1本   | 抜針用                           |