

レジメン名：mFOLFOX6 (5-FU+I-LV+L-OHP) +Bmab 療法 大腸がん

催吐リスク：中等度

処方：1クール 2週間

<点滴> Vポート静脈内抗癌剤持続注入

Day1

- | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------|-----|-------------------|------------------|
| ① 生食 | 20mL | 1本 | 穿刺用 | |
| ② 生食 | 100mL | | | |
| デキサメタゾン (デキサト) | 6.6mg | | | |
| グラニセトロン | 3mg | | 30分 | |
| ③ 生食 | 100mL | | | |
| ベバシズマブ (アバスタ) | 5mg/kg | | 初回 | 90分 |
| | | | 2回目 | 60分 |
| | | | 3回目以降 | 30分 |
| ④ 5%ブドウ糖 | 250mL | | | |
| オキサリプラチン(エルプラット) | 85mg/m ² | | 2時間 | |
| 生食 | 250mL | | | |
| レボホリナート | 200mg/m ² | | 2時間 | 側管orルート2
同時投与 |
| ⑤ 生食 | 50mL | | | |
| 5-FU | 400mg/m ² | | 側管から全開で (5分ぐらい) | |
| ⑥ 生食 | | mL* | | |
| 5-FU | 2400mg/m ² | | 46時間 (インフューザーポンプ) | |
| *インフューザーポンプの容量に合わせて必要量の生食を加える | | | | |
| ⑦ 生食 | 20mL | 1本 | 抜針用 | |