

レジメン名：CPT-11 単独療法 大腸がん

催吐リスク：中等度

処方1：A法 1クール1週間 3-4クール実施 2週間以上休薬

〈点滴〉

Day1

- | | | | |
|--------------|----------------------|--------|--------|
| ① 生食 | 100mL | | |
| デキサメタゾン | 9.9mg | | |
| グラニセトロン | 3mg | 30分 | |
| ② 5%ブドウ糖 | 500mL | | |
| イリノテカン (カプト) | 100mg/m ² | 90分 | |
| ③ 生食 | 50mL | フラッシュ用 | 10分くらい |

〈内服〉

Day2・3

- | | | | |
|-------------------|-----|----|----|
| ① デキサメタゾン (デカドロン) | 8mg | 分2 | 朝昼 |
|-------------------|-----|----|----|

処方2：B法 1クール2週間 2-3クール実施 3週間以上休薬

〈点滴〉

Day1

- | | | | |
|--------------|----------------------|--------|--------|
| ① 生食 | 100mL | | |
| デキサメタゾン | 9.9mg | | |
| グラニセトロン | 3mg | 30分 | |
| ② 5%ブドウ糖 | 500mL | | |
| イリノテカン (カプト) | 150mg/m ² | 90分 | |
| ③ 生食 | 50mL | フラッシュ用 | 10分くらい |

〈内服〉

Day2・3

- | | | | |
|-------------------|-----|----|----|
| ① デキサメタゾン (デカドロン) | 8mg | 分2 | 朝昼 |
|-------------------|-----|----|----|