

レジメン名：TS-1+CPT-11 療法

胃がん 大腸がん

催吐リスク：中等度

処方1： 1クール 4週間

〈点滴〉

Day1・15

- | | | | |
|--------------|----------------------|--------|--------|
| ① 生食 | 100mL | | |
| デキサメタゾン | 9.9mg | | |
| グラニセトロン | 3mg | 30分 | |
| ② 5%ブドウ糖 | 500mL | | |
| イリノテカン (カプト) | 125mg/m ² | 90分 | |
| ③ 生食 | 50mL | フラッシュ用 | 10分くらい |

〈内服〉

Day1-14

- | | | | | | | |
|--------|--|----|----|------|---------|---------|
| ① TS-1 | mg/m ² | 分2 | 朝夕 | Day1 | 夕-Day15 | 朝 |
| | 1.25 m ² 未満 | | | | | 80mg/日 |
| | 1.25 m ² 以上 1.5 m ² 未満 | | | | | 100mg/日 |
| | 1.5 m ² 以上 | | | | | 120mg/日 |

Day2・3、Day16・17

- | | | | |
|-----------------|-----|----|----|
| ② デキサメタゾン (デカト) | 8mg | 分2 | 朝昼 |
|-----------------|-----|----|----|

処方2： 1クール 4週間

〈点滴〉

Day1・8

- | | | | |
|--------------|----------------------|-----|--|
| ① 生食 | 100mL | | |
| デキサメタゾン | 9.9mg | | |
| グラニセトロン | 3mg | 30分 | |
| ② 5%ブドウ糖 | 500mL | | |
| イリノテカン (カプト) | 125mg/m ² | 90分 | |

③ 生食 50mL フラッシュ用 10分くらい

〈内服〉

Day1-14

① TS-1 mg/m² 分2 朝夕 Day1 夕-Day15 朝
1.25 m²未満 80mg/日
1.25 m²以上 1.5 m²未満 100mg/日
1.5 m²以上 120mg/日

Day2・3、Day9・10

② デキサメタゾン (デカドロン) 8mg 分2 朝昼

処方3： 1クール 3週間

〈点滴〉

Day1

① 生食 100mL
デキサメタゾン 9.9mg
グラニセトロン 3mg 30分

② 5%ブドウ糖 500mL
イリノテカン (カプト) 150mg/m² 90分

③ 生食 50mL フラッシュ用 10分くらい

〈内服〉

Day1-14

① TS-1 mg/m² 分2 朝夕 Day1 夕-Day15 朝
1.25 m²未満 80mg/日
1.25 m²以上 1.5 m²未満 100mg/日
1.5 m²以上 120mg/日

Day2・3

② デキサメタゾン (デカドロン) 8mg 分2 朝昼