

レジメン名：LowdoseCDDP+TS-1 療法 胃がん

催吐リスク：高度

処方： 1クール 5週間

<点滴>

Day8・15・22

- | | | | |
|-----------|---------------------|--|-----|
| ① 生食 | 100mL | | |
| デキサメタゾン | 9.9mg | | |
| グラニセトロン | 3mg | | 30分 |
| ② 生食 | 500mL | | |
| シスプラチン | 25mg/m ² | | 90分 |
| ③ ラクトリンゲル | 500mL | | 90分 |

<内服>

Day1-21

- | | | | |
|--------|----------------------|--|----------------|
| ① TS-1 | mg/m ² 分2 | 朝夕 | Day1 夕-Day22 朝 |
| | | 1.25 m ² 未満 | 80mg/日 |
| | | 1.25 m ² 以上 1.5 m ² 未満 | 100mg/日 |
| | | 1.5 m ² 以上 | 120mg/日 |

Day8・15・22

- | | | |
|----------------|-------|----------------|
| ② アプレピタント(イメド) | 125mg | 抗がん剤投与 60-90分前 |
|----------------|-------|----------------|

Day9・10、Day16・17、Day23・24

- | | | |
|----------------|------|------|
| ③ アプレピタント(イメド) | 80mg | 分1 朝 |
|----------------|------|------|

Day9-11、Day16-18、Day23-25

- | | | |
|----------------|-----|-------|
| ④ デキサメタゾン(デカト) | 8mg | 分2 朝昼 |
|----------------|-----|-------|