

レジメン名：FOLFIRI (5-FU+I-LV+CPT-11) +Rmab 療法 大腸がん

催吐リスク：中等度

処方：1クール 2週間

<点滴> Vポート静脈内抗癌剤持続注入

Day1

- | | | | |
|-----------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|
| ① 生食 | 20mL | 1本 | 穿刺用 |
| ② 生食 | 100mL | | |
| デキサメタゾン (デキサート) | 6.6mg | | |
| グラニセトロン | 3mg | | |
| ポララミン | 5mg | 30分 | |
| ③ 生食 | mL | | |
| ラムシルマブ (サイムザ) | 8mg/kg | 60分 (25mg/分を超えない) | |
| | | 全量 250mL となるように生食を加える | |
| | | *PVC フリーのインラインフィルター使用 | |
| ④ 生食 | 50mL | | フラッシュ用 |
| ⑤ 生食 | 250mL | | |
| イリノテカン (カプト) | 150mg/m ² | 90分 | |
| 生食 | 250mL | | |
| レボホリナート | 200mg/m ² | 2時間 | 側管 or ルート 2
同時投与 |
| ⑥ 生食 | 50mL | | |
| 5-FU | 400mg/m ² | | 側管から全開で (5分ぐらい) |
| ⑦ 生食 | mL* | | |
| 5-FU | 2400mg/m ² | 46時間 (インフューザーポンプ) | |
| | | *インフューザーポンプの容量に合わせて必要量の生食を加える | |
| ⑧ 生食 | 20mL | 1本 | 抜針用 |