

レジメン名：TS-1+GEM療法

胆道がん 膵がん

催吐リスク：軽度

処方1： 1クール 3週間

<点滴>

Day1・8

- | | | | |
|---------|-----------------------|--------|--------|
| ① 生食 | 100mL | | |
| デキサメタゾン | 6.6mg | 30分 | |
| ② 生食 | 100mL | | |
| ゲムシタピン | 1000mg/m ² | 30分 | |
| ③ 生食 | 50mL | フラッシュ用 | 10分くらい |

<内服>

Day1-14

- | | | | |
|--------|--|-------|----------------|
| ① TS-1 | mg/m ² | 分2 朝夕 | Day1 夕-Day15 朝 |
| | 1.25 m ² 未満 | | 80mg/日 |
| | 1.25 m ² 以上 1.5 m ² 未満 | | 100mg/日 |
| | 1.5 m ² 以上 | | 120mg/日 |

処方2： 1クール 3週間

<点滴>

Day1・15

- | | | | |
|---------|-----------------------|--------|--------|
| ① 生食 | 100mL | | |
| デキサメタゾン | 6.6mg | 30分 | |
| ② 生食 | 100mL | | |
| ゲムシタピン | 1000mg/m ² | 30分 | |
| ③ 生食 | 50mL | フラッシュ用 | 10分くらい |

<内服>

Day1-14

- | | | | |
|--------|--|-------|----------------|
| ① TS-1 | mg/m ² | 分2 朝夕 | Day1 夕-Day15 朝 |
| | 1.25 m ² 未満 | | 80mg/日 |
| | 1.25 m ² 以上 1.5 m ² 未満 | | 100mg/日 |
| | 1.5 m ² 以上 | | 120mg/日 |