

レジメン名：R-CHOP 療法

非ホジキンリンパ腫

催吐リスク：高度

処方： 1クール 3週間

<点滴>

Day1

- |                |                               |  |
|----------------|-------------------------------|--|
| ① 生食           | 250mL                         | 血管確保用<br>シロホスファミド 終了後全開で   |
| ② 5%ブドウ糖       | mL                            | 10 倍に希釈調製  |
| リツキシマブ(リツサ)    | 375mg/m <sup>2</sup>          | 初回投与は 25mL/h から開始<br>1 時間後副作用なければ 100mL/h<br>さらに 1 時間後に 200mL/h<br>2クール目以降初回副作用なければ 100mL/h から開始<br>1 時間後副作用なければ 200mL/h |
| ③ 生食           | 100mL                         |  |
| グラニセトロン        | 3mg                           | 30 分   |
| ④ 生食           | 100mL                         |  |
| ドキシソルピシン       | 50mg/m <sup>2</sup>           | 30 分<br>グラニセトロン静注 30 分後施行  |
| ⑤ 生食           | 50mL                          |  |
| ピンクリスチン(オビシ)   | 1.4mg/m <sup>2</sup> (最大 2mg) | 15 分   |
| ⑥ 生食           | 500mL                         |  |
| シクロホスファミド(イトサ) | 750mg/m <sup>2</sup>          | 2 時間   |

<内服>

Day1

- |                              |     |               |
|------------------------------|-----|---------------|
| ① クロルフェニラミンマレイン酸塩(ネマルミン) 2mg | 分 1 |               |
| ロキソプロフェン Na 60mg             |     | リツサマ 投与 30 分前 |

Day1

- |                 |       |                     |
|-----------------|-------|---------------------|
| ② アプレピタント (イソト) | 125mg | ドキシソルピシン投与 60-90 分前 |
|-----------------|-------|---------------------|

Day2-3

- |                 |      |       |
|-----------------|------|-------|
| ③ アプレピタント (イソト) | 80mg | 分 1 朝 |
|-----------------|------|-------|

Day1-5

- |                  |                     |     |
|------------------|---------------------|-----|
| ④ プレドニゾロン (プレドニ) | 60mg/m <sup>2</sup> | 分 2 |
|------------------|---------------------|-----|