

レジメン名：R-DeVIC 療法

非ホジキンリンパ腫

催吐リスク：中等度

処方： 1クール 3~4週間

<点滴>

Day0

- | | | |
|-------------------------|----------------------------|--|
| ① 生食 | 100mL | 8時間で施行 |
| ② 5%ブドウ糖
リツキシマブ(リツキ) | mL
375mg/m ² | 10倍に希釈調製

初回投与は 25mL/h から開始
1 時間後副作用なければ 100mL/h
さらに 1 時間後に 200mL/h
2クール目以降初回副作用なければ 100mL/h から開始
1 時間後副作用なければ 200mL/h
側管より施行 |

Day1

- | | | |
|-----------------------|-------------------------------|---|
| ① 生食 | 500mL | 血管確保用
体スファミト [®] 施行後維持程度で施行
最後のス [®] 施行後全開滴下、抜去 |
| ② グラニセトロン | 3mg | 側管より加注
デキサメタゾン直前に施行 |
| ③ 生食
デキサメタゾン(デキサト) | 100mL
40mg/body | 30分 |
| ④ 5%ブドウ糖
カルボプラチン | 250mL
300mg/m ² | 1時間
デキサメタゾンに続いてすぐに施行 |
| ⑤ 5%ブドウ糖
エトポシド | 500mL
100mg/m ² | 2時間 |

- | | | | |
|---|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| ⑥ | 生食
メスナ(ウミナギ) | 100mL
300mg/m ² | 30分 |
| ⑦ | 生食
イホスファミド(体アイト [®]) | 500mL
1500mg/m ² | 2時間 |
| ⑧ | 生食
メスナ(ウミナギ) | 100mL
300mg/m ² | 30分
体アイト [®] 投与4時間後に施行 |
| ⑨ | 生食
メスナ(ウミナギ) | 100mL
300mg/m ² | 30分
体アイト [®] 投与8時間後に施行 |

Day2・3

④を除く Day1 処方

<内服>

Day0

- | | | |
|---|---------------------------|--------------------------|
| ① | クロルフェニラミンマレイン酸塩(ネマルミン)2mg | 分1 |
| | ロキソプロフェン Na 60mg | リキソマ [®] 投与30分前 |