

レジメン名：R-CVP 療法

非ホジキンリンパ腫

催吐リスク：中等度

処方： 1クール 3週間

<点滴>

Day1

- |                         |                                       |   |
|-------------------------|---------------------------------------|---|
| ① 生食                    | 250mL                                 | 血管確保用<br>シロホスファミド 終了後全開で  |
| ② 5%ブドウ糖<br>リツキシマブ(リツキ) | mL<br>375mg/m <sup>2</sup>            | 10 倍に希釈調製<br><br>初回投与は 25mg/h から開始<br>1 時間後副作用なければ 100mg/h<br>さらに開始 2 時間後に 200mg/h<br>2クール目以降初回副作用なければ 100mg/h から開始 |
| ③ グラニセトロン               | 3mg                                   |   |
| ④ 生食<br>ピンクリスチン(オビリン)   | 50mL<br>1.4mg/m <sup>2</sup> (最大 2mg) | 15 分  |
| ⑤ 生食<br>シクロホスファミド(イトキ)  | 500mL<br>750mg/m <sup>2</sup>         | 2 時間  |

<内服>

Day1

- |                        |      |                |
|------------------------|------|----------------|
| ① クロルフェニラミンマレイン酸(ホラミン) | 2mg  |                |
| ロキソプロフェン Na            | 60mg | リツキマブ 投与 30 分前 |

Day1-5

- |          |            |     |
|----------|------------|-----|
| ② プレドニゾン | 100mg/body | 分 2 |
|----------|------------|-----|