レジメン名:B-R 療法 非ホジキンリンパ腫

催吐リスク:中等度

処方: 1クール 4週間

<点滴>

Day1

①生食 mL 10 倍に希釈調製

リツキシマブ(リッキサン) 375mg/㎡

初回投与は 25mL/h から開始

1 時間後副作用なければ 100mL/h

さらに 1 時間後に 200mL/h

2クール目以降初回副作用なければ100mL/hから開始

1 時間後副作用なければ 200mL/h

Day1 • 2

②生食 50mL グラニセトロン 3mg

デキサメタゾン 939mg 15分

③生食 mL 注射用水 mL

ベンダムスチン (トレアキシン) 90mg/㎡ 1 時間

\*100mgに対して注射用水 40mL で溶解

生食に希釈し全量 250mL とする

\*溶解後3時間以内に投与終了する事

④生食 250mL 2 時間

ベンダムスチンと同時開始 残廃棄

<内服>

Day1

①クロルフェニラミンマレイン酸(ポララミン) 2mg

ロキソプロフェン Na 60mg リツキシマブ投与 30 分前

Day3 • 4

②デキサメタゾン (デカドロン) 8mg 分2 朝・昼

適官

③ダイフェン (バクタ) 1 錠

アシクロビル 200mg 分 1 朝食後