

レジメン名：FOLFIRI (5-FU+I-LV+CPT-11) +Bmab 療法 大腸がん

催吐リスク：中等度

処方：1クール 2週間

<点滴> Vポート静脈内抗癌剤持続注入

Day1

- |                 |                       |                               |                  |
|-----------------|-----------------------|-------------------------------|------------------|
| ① 生食            | 20mL                  | 1本                            | 穿刺用              |
| ② 生食            | 100mL                 |                               |                  |
| デキサメタゾン (デキサート) | 6.6mg                 |                               |                  |
| グラニセトロン         | 3mg                   | 30分                           |                  |
| ③ 生食            | 100mL                 |                               |                  |
| ベバシズマブ (アバスタ)   | 5mg/kg                | 初回                            | 90分              |
|                 |                       | 2回目                           | 60分              |
|                 |                       | 3回目以降                         | 30分              |
| ④ 生食            | 250mL                 |                               |                  |
| イリノテカン (カプト)    | 150mg/m <sup>2</sup>  | 90分                           |                  |
| 生食              | 250mL                 |                               |                  |
| レボホリナート         | 200mg/m <sup>2</sup>  | 2時間                           | 側管orルート2<br>同時投与 |
| ⑤ 生食            | 50mL                  |                               |                  |
| 5-FU            | 400mg/m <sup>2</sup>  | 側管から全開で                       | (5分ぐらい)          |
| ⑥ 生食            | mL*                   |                               |                  |
| 5-FU            | 2400mg/m <sup>2</sup> | 46時間                          | (インフューザーポンプ)     |
|                 |                       | *インフューザーポンプの容量に合わせて必要量の生食を加える |                  |
| ⑦ 生食            | 20mL                  | 1本                            | 抜針用              |