

レジメン名：GC療法

尿路上皮癌

催吐リスク：高度

処方： 1クール 4週間

<点滴>

Day1

- |                        |                                |               |
|------------------------|--------------------------------|---------------|
| ① 生食                   | 100mL                          | ルートキープ・フラッシュ用 |
| ② 生食<br>デキサメタゾン        | 100mL<br>6.6mg                 | 30分           |
| ③ 生食<br>ゲムシタピン (ジエガール) | 100mL<br>1000mg/m <sup>2</sup> | 30分           |
| ④ アセトキープ3G             | 500mL                          | 6時間           |
| ⑤ ソリュージェンF             | 500mL                          | 7時間           |

Day2

本体

- |            |       |     |
|------------|-------|-----|
| ① アセトキープ3G | 500mL | 6時間 |
| ② ソリュージェンF | 500mL | 6時間 |
| ③ アセトキープ3G | 500mL | 6時間 |
| ④ ソリュージェンF | 500mL | 6時間 |

側管

- |                     |                              |     |
|---------------------|------------------------------|-----|
| ① 生食<br>パロノセトロン(アキ) | 100mL<br>0.75mg              |     |
| デキサメタゾン             | 9.9mg                        | 30分 |
| ② 20%マンニトール         | 300mL                        | 60分 |
| ③ 生食<br>シスプラチン      | 500mL<br>70mg/m <sup>2</sup> | 2時間 |
| ④ 20%マンニトール         | 300mL                        | 1時間 |

Day3

本体

① アセトキープ 3G	500mL	6時間
② ソリュージェン F	500mL	6時間
③ アセトキープ 3G	500mL	6時間
④ ソリュージェン F	500mL	6時間

側管

① 生食	100mL	
デキサメタゾン	6.6mg	30分

Day4

本体

① アセトキープ 3G	500mL	6時間
② ソリュージェン F	500mL	6時間
③ アセトキープ 3G	500mL	6時間

側管

① 生食	100mL	
デキサメタゾン	6.6mg	30分

Day8・15

① 生食	100mL	ルートキープ・フラッシュ用
② 生食	100mL	
デキサメタゾン	6.6mg	30分
③ 生食	100mL	
ゲムシタピン (ジエムザール)	1000mg/m <sup>2</sup>	30分

<内服>

Day2

① アプレピタント(イクト)	125mg	抗がん剤投与 60-90分前
----------------	-------	----------------

Day3・4

② アプレピタント(イクト)	80mg	分1 朝
----------------	------	------