

レジメン名：ELd療法（1～2サイクル）

多発性骨髄腫

催吐リスク：中等度

処方： 1サイクル 4週間

<点滴>

Day1・8・15・22

- ① 生食 100mL  
\*維持程度の速度で滴下、最後はフラッシュ用として使用
- ② 生食 50mL  
デキサメタゾン 6.6mg 15分  
\*IL7<sup>+</sup>リチイ投与 45分前-90分前
- ③ 5%ブドウ糖液 mL  
注射用水（溶解用） mL  
エロツズマブ（エムプリシティー） 10mg/kg

投与時期		投与速度(mL/分)		
		投与開始 0-30分	投与開始 30-60分	投与開始 60分以降
第1サイクル	初回投与	0.5	1	2
	2回目投与	3	4	
	3及び4回目投与	5		
第2サイクル以降		5		

体重	希釈液量
50kg未満	150mL
50kg-90kg	250mL
90kg越え	350mL

- \* 300mg 製剤の場合は1.3mL、  
400mg 製剤の場合は1.7mLの注射用水で溶解
- \* 0.22ミクロン以下のインラインフィルター使用

<内服>

Day1-21

- ① レナリドミド (レラミド) 25mg/日

Day1・8・15・22

- ② デキサメタゾン(デカックス) 28mg IM<sup>7</sup>リテ<sup>1</sup>投与の3-24時間前
- ③ アセトアミノフェン(加ナール) 300-1000mg  
ジフェンヒドラミン(スチミン) 25-50mg  
ファモチジン 20mg  
IM<sup>7</sup>リテ<sup>1</sup>投与の45分前-90分前