

レジメン名：SP（3週毎）療法（Vポート）

胃がん

催吐リスク：高度

処方： 1クール 3週間

<点滴>Vポート使用

Day1

- | | | |
|---------------|---------------------|------|
| ① KN3号輸液 | 500mL | |
| 硫酸Mg液 1mEq/mL | 8mL (8mEq) | 60分 |
| ② KN3号輸液 | 500mL | 60分 |
| ③ 生食 | 100mL | |
| デキサメタゾン | 6.6mg | |
| グラニセトロン | 3mg | 30分 |
| ④ 生食 | 250mL | |
| シスプラチン | 60mg/m ² | 60分 |
| ⑤ フロセミド 20mg | 1A | I.V. |
| ⑥ 生食 | 250mL | 30分 |

<内服>

Day1-14

- | | | | |
|--------|----|--|----------------|
| ① TS-1 | 分2 | 朝夕 | Day1 夕-Day15 朝 |
| | | 1.25 m ² 未満 | 80mg/日 |
| | | 1.25 m ² 以上 1.5 m ² 未満 | 100mg/日 |
| | | 1.5 m ² 以上 | 120mg/日 |

Day1

- | | | |
|----------------|-------|----------------|
| ② アプレピタント(イモド) | 125mg | 抗がん剤投与 60-90分前 |
|----------------|-------|----------------|

Day2,3

- | | | |
|----------------|------|------|
| ③ アプレピタント(イモド) | 80mg | 分1 朝 |
|----------------|------|------|

Day2-4

- | | | |
|------------------|-----|-------|
| ④ デキサメタゾン(デカドロン) | 8mg | 分2 朝昼 |
|------------------|-----|-------|