

レジメン名：FOLFIRI（5-FU+I-LV+CPT-11）＋ザルトラップ療法
大腸がん

催吐リスク：中等度

処方：1クール 2週間

<点滴> Vポート静脈内抗癌剤持続注入

Day1

- | | | | |
|----------------|-----------------------|------|-------------------------------|
| ① 生食 | 20mL | 1本 | 穿刺用 |
| ② 生食 | 100mL | | |
| デキサメタゾン（デキサート） | 6.6mg | | |
| グラニセトロン | 3mg | 30分 | |
| ③ 生食 | 100mL | | |
| アフリベルセプト ベータ | 4mg/kg | 60分 | |
| (ザルトラップ) | | | |
| | | | *0.6-8mg/mLの濃度になるようにする |
| | | | *PVCフリーのインラインフィルター使用 |
| ④ 生食 | 50mL | | フラッシュ用 |
| ⑤ 生食 | 250mL | | |
| イリノテカン（カプト） | 150mg/m ² | 90分 | |
| 生食 | 250mL | | |
| レボホリナート | 200mg/m ² | 2時間 | 側管orルート2
同時投与 |
| ⑥ 生食 | 50mL | | |
| 5-FU | 400mg/m ² | | 側管から全開で（5分ぐらい） |
| ⑦ 生食 | mL* | | |
| 5-FU | 2400mg/m ² | 46時間 | （インフューザーポンプ） |
| | | | *インフューザーポンプの容量に合わせて必要量の生食を加える |
| ⑧ 生食 | 20mL | 1本 | 抜針用 |