

レジメン名：IP療法（Vポート）

神経内分泌がん

催吐リスク：高度

処方： 1クール 4週間

〈点滴〉

Day1

① 生食 20mL 穿刺用

② 生食 100mL
デキサメタゾン 9.9mg
パロノセトロン（アキツ） 0.75mg 30分

③ 5%ブドウ糖 500mL
イリノテカン（カプト） 60mg/m² 90分

④ KN3号輸液 500mL
硫酸Mg液 8mEq 60分

⑤ 20%マンニトール注射液 300mL 60分

⑥ 生食 500mL
シスプラチン 60mg/m² 60分

⑦ 生食 500mL 60分

⑧ KN3号 500mL 60分

Day8・15

① 生食 20mL 穿刺用

② 生食 100mL
デキサメタゾン 9.9mg
パロノセトロン（アキツ） 0.75mg 30分

③ 5%ブドウ糖液	500mL	
イリノテカン（カプト）	60mg/m ²	90分

④ 生食	50mL	フラッシュ用
------	------	--------

〈内服〉

Day1

① アプレピタント(イット)	125mg	抗がん剤投与 60-90分前
----------------	-------	----------------

Day2・3

② アプレピタント(イット)	80mg	分1 朝
----------------	------	------

Day2-4

③ デキサメタゾン（デカト）	8mg	分2 朝昼
----------------	-----	-------

適宜、水分負荷の指示を加える。