

レジメン名：ロンサーフ+Bmab療法 大腸がん

催吐リスク：低度

処方：1クール 4週間

<点滴> Vポート静脈内抗癌剤持続注入

Day1・15

① 生食	20mL	1本	穿刺用
② 生食	100mL		
デキサメタゾン (デキサト)	3.3mg		30分
③ 生食	100mL		
ベバシズマブ (アバシブ)	5mg/kg	初回	90分
		2回目	60分
		3回目以降	30分
④ 生食	50mL	1本	フラッシュ用

<内服>

Day1-5、Day8-12 内服 Day6-7、Day13-28 休薬

- ① ロンサーフ mg/m² 分2 朝夕
- 5日間連続経口投与したのち2日間休薬する。これを繰り返したのち14日間休薬。
- | | |
|-----------------------------|----------|
| 1.07 m ² 未満 | : 35mg/回 |
| 1.07~1.23 m ² 未満 | : 40mg/回 |
| 1.23~1.38 m ² 未満 | : 45mg/回 |
| 1.38~1.53 m ² 未満 | : 50mg/回 |
| 1.53~1.69 m ² 未満 | : 55mg/回 |
| 1.69~1.84 m ² 未満 | : 60mg/回 |
| 1.84~1.99 m ² 未満 | : 65mg/回 |
| 1.99~2.15 m ² 未満 | : 70mg/回 |
| 2.15 m ² 以上 | : 75mg/回 |