

レジメン名：FOLFIRINOX（5-FU+L-OHP+I-LV+CPT-11）療法 膀胱癌

催吐リスク：高度

処方：1クール 2週間

<点滴> Vポート静脈内抗癌剤持続注入

Day1

① 生食	20mL	1本	穿刺用	
② 生食	100mL			
デキサメタゾン（デキサート）	9.9mg			
グラニセトロン	3mg	30分		
③ 5%ブドウ糖液	250mL			
オキサリプラチン（エルプラット）	85mg/m ²	2時間		
④ 生食	100mL			
ブチルスコポラミン	1A	30分		ルートB
⑤ 生食	250mL			
イリノテカン（カプト）	180mg/m ²	90分		ルートB
生食	250mL			
レボホリナート	200mg/m ²	2時間		ルートA 同時投与
⑥ 生食	50mL			
5-FU	400mg/m ²	側管から全開で（5分ぐらい）		
⑦ 生食	mL*			
5-FU	2400mg/m ²	46時間	（インフューザーポンプ）	
*インフューザーポンプの容量に合わせて必要量の生食を加える				
⑧ 生食	20mL	1本	抜針用	

<内服>

Day1

① アプレピタント（イクト）	125mg	抗がん剤投与 60-90分前
----------------	-------	----------------

Day2・3

② アプレピタント（イクト）	80mg	分1 朝
③ デキサメタゾン（デキサート）	8mg	分2 朝昼