

レジメン名：SOX 療法

胃がん  
 催吐リスク：中等度

処方：1クール 3週間

<点滴> 末梢静脈内注射

Day1

- |   |                  |                      |        |        |
|---|------------------|----------------------|--------|--------|
| ① | 5%ブドウ糖           | 100mL                |        |        |
|   | デキサメタゾン          | 9.9mg                |        |        |
|   | グラニセトロン          | 3mg                  | 30分    |        |
| ② | 5%ブドウ糖           | 250mL                |        |        |
|   | オキサリプラチン(エルプラット) | 100mg/m <sup>2</sup> | 2時間    |        |
| ③ | 生食               | 50mL                 | フラッシュ用 | 10分くらい |

<点滴> Vポート静脈内抗癌剤持続注入

Day1

- |   |                  |                      |     |     |
|---|------------------|----------------------|-----|-----|
| ① | 生食               | 20mL                 | 1本  | 穿刺用 |
| ② | 5%ブドウ糖           | 100mL                |     |     |
|   | デキサメタゾン          | 9.9mg                |     |     |
|   | グラニセトロン          | 3mg                  | 30分 |     |
| ③ | 5%ブドウ糖           | 250mL                |     |     |
|   | オキサリプラチン(エルプラット) | 100mg/m <sup>2</sup> | 2時間 |     |
| ④ | 生食               | 50mL                 | 1本  | 抜針用 |

<内服>

Day1-14

- |   |      |  |       |             |
|---|------|--|-------|-------------|
| ① | TS-1 | mg/m <sup>2</sup>                            | 分2    | 朝夕          |
|   |      |  | Day1  | 夕-Day15朝 内服 |
|   |      |  | Day15 | 夕-Day22朝 休薬 |
|   |      | 1.25 m <sup>2</sup> 未満                       |       | 80mg/日      |
|   |      | 1.25 m <sup>2</sup> 以上 1.5 m <sup>2</sup> 未満 |       | 100mg/日     |
|   |      | 1.5 m <sup>2</sup> 以上                        |       | 120mg/日     |

Day2-3

- |   |                 |     |    |    |
|---|-----------------|-----|----|----|
| ② | デキサメタゾン (デカドロン) | 8mg | 分2 | 朝昼 |
|---|-----------------|-----|----|----|