

レジメン名：SOX 療法

大腸がん
 催吐リスク：中等度

処方：1クール 3週間

〈点滴〉 末梢静脈内注射

Day1

- | | | | | |
|---|------------------|----------------------|--------|--------|
| ① | 5%ブドウ糖 | 100mL | | |
| | デキサメタゾン | 9.9mg | | |
| | グラニセトロン | 3mg | 30分 | |
| ② | 5%ブドウ糖 | 250mL | | |
| | オキサリプラチン(エルプラット) | 130mg/m ² | 2時間 | |
| ③ | 生食 | 50mL | フラッシュ用 | 10分くらい |

〈点滴〉 Vポート静脈内抗癌剤持続注入

Day1

- | | | | | |
|---|------------------|----------------------|-----|-----|
| ① | 生食 | 20mL | 1本 | 穿刺用 |
| ② | 5%ブドウ糖 | 100mL | | |
| | デキサメタゾン | 9.9mg | | |
| | グラニセトロン | 3mg | 30分 | |
| ③ | 5%ブドウ糖 | 250mL | | |
| | オキサリプラチン(エルプラット) | 130mg/m ² | 2時間 | |
| ④ | 生食 | 20mL | 1本 | 抜針用 |

〈内服〉

Day1-14

- | | | | | |
|---|------|--|-------|-------------|
| ① | TS-1 | mg/m ² | 分2 | 朝夕 |
| | | | Day1 | 夕-Day15朝 内服 |
| | | | Day15 | 夕-Day22朝 休薬 |
| | | 1.25 m ² 未満 | | 80mg/日 |
| | | 1.25 m ² 以上 1.5 m ² 未満 | | 100mg/日 |
| | | 1.5 m ² 以上 | | 120mg/日 |

Day2-3

- | | | | | |
|---|-----------------|-----|----|----|
| ② | デキサメタゾン (デカドロン) | 8mg | 分2 | 朝昼 |
|---|-----------------|-----|----|----|