

レジメン名：Her+SOX 療法

胃がん

催吐リスク：中等度

処方：1クール 3週間

<点滴> 末梢静脈内注射

Day1

① 生食	50mL		ハーセプチン投与までの維持
② 生食	250mL		
トラスズツマブ	8mg/kg (初回投与)		90分 (初回投与)
	6mg/kg (2回目投与以降)		30分 (2回目投与以降)
③ 5%ブドウ糖	100mL		
デキサメタゾン	9.9mg		
グラニセトロン	3mg		30分
④ 5%ブドウ糖	250mL		
オキサリプラチン(エルゾラット)	100mg/m ²		2時間
⑤ 生食	50mL	フラッシュ用	10分くらい

<点滴> Vポート静脈内抗癌剤持続注入

Day1

① 生食	20mL	1本	穿刺用
② 生食	50mL		ハーセプチン投与までの維持
③ 生食	250mL		
トラスズツマブ	8mg/kg (初回投与)		90分 (初回投与)
	6mg/kg (2回目投与以降)		30分 (2回目投与以降)
④ 5%ブドウ糖	100mL		
デキサメタゾン	9.9mg		
グラニセトロン	3mg		30分
⑤ 5%ブドウ糖	250mL		
オキサリプラチン(エルゾラット)	100mg/m ²		2時間
⑥ 生食	50mL	1本	抜針用

<内服>

Day1-14

① TS-1	mg/m ²	分2 朝夕	
		Day1 夕-Day15 朝	内服
		Day15 夕-Day22 朝	休薬
	1.25 m ² 未満		80mg/日
	1.25 m ² 以上 1.5 m ² 未満		100mg/日
	1.5 m ² 以上		120mg/日

Day2-3

② デキサメタゾン (デカドロン)	8mg	分2 朝昼	
-------------------	-----	-------	--