

レジメン名：S1+DTX療法

胃がん

催吐リスク：低～中等

度

処方：1クール 3週間

<点滴> 末梢静脈内注射 2～7クール目のみ

Day1

- | | | | |
|---------------|---------------------|--------|--------|
| ① 生食 | 100mL | | |
| デキサメタゾン | 9.9mg | | |
| グラニセトロン | 3mg | 30分 | |
| ② 生食 | 250mL | | |
| ドセタキセル(ワタキセル) | 40mg/m ² | 1時間 | |
| ③ 生食 | 50mL | フラッシュ用 | 10分くらい |

<点滴> Vポート静脈内抗癌剤持続注入 2～7クール目のみ

Day1

- | | | | |
|---------------|---------------------|--------|--------|
| ① 生食 | 20mL | 1本 | 穿刺用 |
| ② 生食 | 100mL | | |
| デキサメタゾン | 9.9mg | | |
| グラニセトロン | 3mg | 30分 | |
| ③ 生食 | 250mL | | |
| ドセタキセル(ワタキセル) | 40mg/m ² | 1時間 | |
| ④ 生食 | 50mL | フラッシュ用 | 10分くらい |

<内服>

Day1 タ-15 朝まで

- | | | | |
|--------|--|-------|--------------|
| ① TS-1 | mg/m ² | 分2 | 朝夕 |
| | | Day1 | タ-Day15 朝 内服 |
| | | Day15 | タ-Day22 朝 休薬 |
| | 1.25 m ² 未満 | | 80mg/日 |
| | 1.25 m ² 以上 1.5 m ² 未満 | | 100mg/日 |
| | 1.5 m ² 以上 | | 120mg/日 |

