

## レジメン名：G-B療法

## 非ホジキンリンパ腫

催吐リスク：中等度

処方：1クール 4週間

&lt;点滴&gt;

Day1

- |                |                     |   |
|----------------|---------------------|---|
| ① 生食           | 100mL               | 30分   |
| デカドロン          | 19.8mg              | ガザイバ点滴 1時間前までに終了  |
| ② 生食           | 100mL               | 60分   |
| ③ 生食           | 210mL               |   |
| オビヌツズマブ (ガザイバ) | 1000mg              | 初回投与は 12.5mL/h から開始<br>30分毎に副作用なければ 12.5mL/h ずつ<br>最大で 100mL/h まで速度を上げることができる<br>2回目以降初回副作用なければ 25mL/h から開始<br>30分毎に副作用なければ 25mL/h ずつ<br>最大で 100mL/h まで速度を上げることができる<br>インラインフィルター使用 |
| ④ 生食           | 50mL                | 30分   |
| グラニセトロン        | 3mg                 |   |
| ⑤ 生食           | 250mL               |   |
| ベンダムスチン        | 90mg/m <sup>2</sup> | 60分   |
| ⑥ 生食           | 50mL                | フラッシュ用  |

Day2

- |         |                     |        |
|---------|---------------------|--------|
| ① 生食    | 100mL               |        |
| デカドロン   | 9.9mg               |        |
| グラニセトロン | 3mg                 | 30分    |
| ② 生食    | 250mL               |        |
| ベンダムスチン | 90mg/m <sup>2</sup> | 60分    |
| ③ 生食    | 50mL                | フラッシュ用 |

Day8・Day15

- |                |        |  |
|----------------|--------|--|
| ① 生食           | 100mL  | 30分  |
| デカドロン          | 19.8mg | ガザイバ点滴 1時間前までに終了   |
| ② 生食           | 100mL  | 60分  |
| ③ 生食           | 210mL  |  |
| オビヌツズマブ (ガザイバ) | 1000mg | 2回目以降初回副作用なければ 25mL/h から開始<br>30分毎に副作用なければ 25mL/h ずつ<br>最大で 100mL/h まで速度を上げることができる<br>インラインフィルター使用 |
| ④ 生食           | 50mL   | 30分  |

&lt;内服&gt;

Day1 (1クール目のみ Day8・Day15 も)

- |                          |      |             |
|--------------------------|------|-------------|
| ① クロルフェニラミン塩酸塩(ネラルミン)2mg | 分 1  |             |
| ロキソプロフェン Na              | 60mg | ガザイバ投与 30分前 |