

レジメン名：CDDP+S1 RT 併用療法（末梢・Vポート）

肺がん
催吐リスク：高度

処方： 1クール 4週間
<点滴>末梢/Vポート使用

Day1

（ 生食	20mL	ポート穿刺時）	
① 生食	100mL		
デキサメタゾン	9.9mg		
グラニセトロン	3mg	30分	
② ヴィーンF	500mL		
硫酸 Mg 液 1mEq/mL	8mL (8mEq)	60分	
③ マンニトール注射液	300mL	40分	
④ 生食	250mL		
シスプラチン	60mg/m ²	60分	
⑤ ヴィーンF	500mL	60分	
（ 生食	20mL	ポート抜針時）	

<内服>

Day1-14

① TS-1	分 2	朝夕	Day1 夕-Day15 朝
		1.25 m ² 未満	80mg/日
		1.25 m ² 以上 1.5 m ² 未満	100mg/日
		1.5 m ² 以上	120mg/日

Day1

② アプレピタント(イモド)	125mg	抗がん剤投与 60-90分前
----------------	-------	----------------

Day2-3

③ アプレピタント(イモド)	80mg	分 1 朝
----------------	------	-------

Day2-4

④ デキサメタゾン(デカドロン)	8mg	分 2 朝昼
------------------	-----	--------