

レジメン名：CDDP+VNR RT 併用療法（末梢・Vポート）

肺がん
催吐リスク：高度

処方： 1クール 4週間
<点滴>末梢/Vポート使用

Day1

（ 生食	20mL	ポート穿刺時）	
① 生食	100mL		
デキサメタゾン	9.9mg		
グラニセトロン	3mg		30分
② 生食	50mL		
ビノレルビン（ハルピソ）	20mg/m ²		5分
③ ヴィーンF	500mL		
硫酸Mg液 1mEq/mL	8mL (8mEq)		60分
④ マンニトール注射液	300mL		40分
⑤ 生食	250mL		
シスプラチン	80mg/m ²		60分
⑥ ヴィーンF	500mL		60分
（ 生食	20mL	ポート抜針時）	

Day8

（ 生食	20mL	ポート穿刺時）	
① 生食	50mL		30分
② 生食	50mL		
ビノレルビン（ハルピソ）	20mg/m ²		5分
③ 生食	250mL		30分

<内服>

Day1

① アプレピタント(イモド)	125mg	抗がん剤投与 60-90分前
----------------	-------	----------------

Day2.3

② アプレピタント(イモド)	80mg	分1 朝
----------------	------	------

Day2-4

③ デキサメタゾン(デカドロン)	8mg	分2 朝昼
------------------	-----	-------