

レジメン名：FOLFOXIRI+B-mab 療法
度

催吐リスク：高

処方：1クール 2週間

<点滴> Vポート静脈内抗癌剤持続注入

Day1

- | | | | | |
|------------------|-----------------------|-----|-------------------|------------------------------|
| ① 生食 | 20mL | 1本 | 穿刺用 | |
| ② 生食 | 100mL | | | |
| デキサメタゾン (デキサート) | 9.9mg | | | |
| グラニセトロン | 3mg | | 30分 | |
| ③ 生食 | 100mL | | | |
| ベバシズマブ (アバスタ) | 5mg/kg | | 初回 | 90分 |
| | | | 2回目 | 60分 |
| | | | 3回目以降 | 30分 |
| ④ 生食 | 250mL | | | |
| イリノテカン (カプト) | 165mg/m ² | | 1.5時間 | |
| ⑤ 5%ブドウ糖 | 250mL | | | |
| オキサリプラチン(エルプラット) | 85mg/m ² | | 2時間 | |
| ⑤ 生食 | 250mL | | | 側管 or ルート2 |
| レボホリナート | 200mg/m ² | 2時間 | オキサリプラチンと同時投与 | |
| ⑥ 生食 | mL* | | | |
| 5-FU | 3200mg/m ² | | 46時間 (インフューザーポンプ) | |
| | | | | インフューザーポンプの容量に合わせて必要量の生食を加える |
| ⑦ 生食 | 20mL | 1本 | 抜針用 | |

<内服>

Day1

- | | | |
|----------------|-------|------------------|
| ① アプレピタント(イキド) | 125mg | イリノテカン投与 60-90分前 |
|----------------|-------|------------------|

Day2-3

- | | | |
|----------------|------|------|
| ② アプレピタント(イキド) | 80mg | 分1 朝 |
|----------------|------|------|

Day2-4

③ デキサメタゾン (デカドロン) 8mg

分2 朝昼