

レジメン名：VP-16+CDDP療法（末梢・Vポート） 神経内分泌細胞がん  
 催吐リスク：高度

処方： 1クール 4週間  
 <点滴>末梢/Vポート使用

Day1

（ 生食	20mL	ポート穿刺時）	
① 生食	500mL		メイン化学療法終了まで
② 生食	500mL		
KCL	10mL (10mEq)		
硫酸 Mg 液 1mEq/mL	4mL (4mEq)		60分 側管
③ 生食	100mL		
デキサメタゾン	6.6mg		
アロキシ	0.75mg		30分 側管
④ 5%ブドウ糖液	500mL		
エトポシド	100mg/m <sup>2</sup>		90分 側管
⑤ マンニトール注射液	300mL		30分 側管
⑥ 生食	300mL		
シスプラチン	80mg/m <sup>2</sup>		120分側管
⑦生食	500mL		
KCL	10mL (10mEq)		
硫酸 Mg 液 1mEq/mL	4mL (4mEq)		60分 側管
（ 生食	20mL	ポート抜針時）	

Day2-3

（ 生食	20mL	ポート穿刺時）	
① 生食	500mL		メイン化学療法終了まで
② 生食	100mL		
デキサメタゾン	6.6mg		30分 側管
③ 5%ブドウ糖液	500mL		
エトポシド	100mg/m <sup>2</sup>		90分 側管
（ 生食	20mL	ポート抜針時）	

<内服>

Day1

① アプレピタント(イマド)	125mg	抗がん剤投与 60-90分前
----------------	-------	----------------

Day2.3

② アプレピタント(イマド)	80mg	分1 朝
----------------	------	------