

レジメン名：wKd 療法 多発性骨髄腫

催吐リスク：低等度

処方 28日間

〈点滴〉 1クール目

Day1

- | | | |
|-------------------|---------------------|--------------------------|
| (1) '生食 | 20mL | ポート穿刺時使用) |
| ① 生食 | 100mL | ルートキープ |
| ② 5%ブドウ糖 | 50mL | |
| 注射用水 | 必要量 | カiproリス 10mg あたり 5mL で溶解 |
| カルフィルゾミブ (カイ° 叫入) | 20mg/m ² | 30分 |
| 終了後①の残りの生食でフラッシュ | | |

Day8・15

- | | | |
|-------------------|---------------------|--------------------------|
| (1) '生食 | 20mL | ポート穿刺時使用) |
| ① 生食 | 100mL | ルートキープ |
| ② 5%ブドウ糖 | 50mL | |
| 注射用水 | 必要量 | カiproリス 10mg あたり 5mL で溶解 |
| カルフィルゾミブ (カイ° 叫入) | 70mg/m ² | 30分 |
| 終了後①の残りの生食でフラッシュ | | |

〈点滴〉 2クール目以降

Day1・8・15

- | | | |
|-------------------|---------------------|--------------------------|
| (1) '生食 | 20mL | ポート穿刺時使用) |
| ① 生食 | 100mL | ルートキープ |
| ② 5%ブドウ糖 | 50mL | |
| 注射用水 | 必要量 | カiproリス 10mg あたり 5mL で溶解 |
| カルフィルゾミブ (カイ° 叫入) | 70mg/m ² | 30分 |
| 終了後①の残りの生食でフラッシュ | | |

〈内服〉

Day1・8・15・22

- | | | |
|--------------------|------|-----|
| ① デキサメタゾン (レダ° 叫入) | 40mg | 分 1 |
|--------------------|------|-----|