

## レジメン名：Cmab+PTX 療法

## 頭頸部癌

催吐リスク：低等度

処方 1クール 7日間

〈点滴〉1クール目

Day1

- |                 |                        |           |
|-----------------|------------------------|-----------|
| (①) 生食          | 20mL                   | ポート穿刺時使用) |
| ① 生食            | 100mL                  | 30分       |
| デカドロン           | 9.9mg                  |           |
| ファモチジン          | 20mg                   |           |
| ポララミン           | 5mg                    |           |
| ② 生食            | 必要量                    |           |
| セツキシマブ (ア-ヒ ャク) | 400mg/m <sup>2</sup>   | 120分      |
|                 | トータル量が500mLとなるように生食で希釈 |           |
| ③ 生食            | 100mL                  | 60分       |
|                 | 様子観察のため                |           |
| ④ 生食            | 250mL                  | 60分       |
| パクリタキセル         | 80mg/m <sup>2</sup>    |           |
| ⑤ 生食            | 50mL                   | フラッシュ     |

〈点滴〉2クール目以降

Day1

- |                 |                        |           |
|-----------------|------------------------|-----------|
| (①) 生食          | 20mL                   | ポート穿刺時使用) |
| ① 生食            | 100mL                  | 30分       |
| デカドロン           | 9.9mg                  |           |
| ファモチジン          | 20mg                   |           |
| ポララミン           | 5mg                    |           |
| ② 生食            | 必要量                    |           |
| セツキシマブ (ア-ヒ ャク) | 250mg/m <sup>2</sup>   | 60分       |
|                 | トータル量が250mLとなるように生食で希釈 |           |
| ③ 生食            | 50mL                   | フラッシュ     |
| ④ 生食            | 250mL                  | 60分       |
| パクリタキセル         | 80mg/m <sup>2</sup>    |           |
| ⑤ 生食            | 50mL                   | フラッシュ     |