

レジメン名：Pola+BR 療法

悪性リンパ腫

催吐リスク：中等度

処方： 1クール 3週間

<点滴>

1クール目 Day1

- | | | |
|-------------|----------------------|---|
| (① '生食 | 20mL | ポート穿刺時) |
| ① 生食 | 50mL | 血管確保 |
| ② 生食 | mL | 10 倍に希釈調製 |
| リツキシマブ(リツサ) | 375mg/m ² | 初回投与は 25mL/h から開始
1 時間後副作用なければ 100mL/h
さらに 1 時間後に 200mL/h |
| | | 2クール目以降初回副作用なければ 100mL/h から開始
1 時間後副作用なければ 200mL/h |
| ③ 生食 | | フラッシュ |

1クール目 Day2

- | | | |
|------------------------------|---------------------|---|
| (① '生食 | 20mL | ポート穿刺時) |
| ① 生食 | 100mL | |
| グラニセトロン | 3mg | |
| デカドロン | 9.9mg | 30 分 |
| ② 生食 | 100mL | |
| 注射用水 | 必要量 | |
| ポラツズマブ (ポライビ [®] -) | 1.8mg/kg | 初回は 90 分。2 回目以降は 30 分で可
ポライビー 30mg は注射用水 1.8mL, 140mg は 7.2mL で溶解し 20mg/mL の
濃度とし必要量を生食で希釈。 |
| ③ 生食 | 100mL | 30 分 様子観察 |
| ④ 生食 | 250mL | |
| ベンダムスチン (トリアツ) | 90mg/m ² | 60 分 |
| ⑤ 生食 | 50mL | フラッシュ |

1クール目 Day3

- | | | |
|----------------|---------------------|----------|
| (① '生食 | 20mL | ポート穿刺時) |
| ① 生食 | 100mL | |
| グラニセトロン | 3mg | |
| デカドロン | 9.9mg | 30 分 |
| ② 生食 | 250mL | |
| ベンダムスチン (トリアツ) | 90mg/m ² | 60 分 |
| ③ 生食 | 50mL | フラッシュ |

<内服>

Day1、2

- | | | |
|-----------------|-----|---------------------|
| ① ロキソプロフェン 60mg | 1 錠 | Day1 はリツキサン投与 30 分前 |
| ポララミン 2mg | 1 錠 | Day2 はポライビー投与 30 分前 |

<点滴>

2クール目 Day1

(①) 生食	20mL	ポート穿刺時)
①生食	50mL	血管確保
②生食	mL	10 倍に希釈調製
リツキシマブ(リツサ)	375mg/m ²	初回投与は 25mL/h から開始 1 時間後副作用なければ 100mL/h さらに 1 時間後に 200mL/h

2クール目以降初回副作用なければ 100mL/h から開始
1 時間後副作用なければ 200mL/h

③ 生食	100mL	
グラニセトロン	3mg	
デカドロン	9.9mg	30 分
④ 生食	100mL	
注射用水	必要量	
ポラツズマブ (ポライビ [®] -)	1.8mg/kg	初回は 90 分。2 回目以降は 30 分で可 ポライビー 30mg は注射用水 1.8mL, 140mg は 7.2mL で溶解し 20mg/mL の 濃度とし必要量を生食で希釈。
⑤ 生食	100mL	30 分 様子観察
⑥ 生食	250mL	
ベンダムスチン (トリアキツ)	90mg/m ²	60 分
⑦ 生食	50mL	フラッシュ

2クール目 Day2

(①) 生食	20mL	ポート穿刺時)
① 生食	100mL	
グラニセトロン	3mg	
デカドロン	9.9mg	30 分
② 生食	250mL	
ベンダムスチン (トリアキツ)	90mg/m ²	60 分
③ 生食	50mL	フラッシュ

<内服>

Day1

② ロキソプロフェン 60mg	1 錠	リツキサン投与 30 分前
ボアラミン 2mg	1 錠	