

レジメン名：CPT-11+Her 療法

胃がん

催吐リスク：中等度

処方：1クール 6週間

<点滴> Vポート静脈内抗癌剤持続注入

Day1

|             |                      |    |               |
|-------------|----------------------|----|---------------|
| ① 生食        | 20mL                 | 1本 | 穿刺用           |
| ② 生食        | 50mL                 |    | ハーセプチン投与までの維持 |
| ③ 生食        | 250mL                |    |               |
| トラスズツマブ     | 8mg/kg (初回投与)        |    | 90分 (初回投与)    |
| ④ 生食        | 100mL                |    |               |
| デキサメタゾン     | 9.9mg                |    |               |
| グラニセトロン     | 3mg                  |    | 30分           |
| ⑤ 生食        | 250mL                |    |               |
| イリノテカン(カプト) | 150mg/m <sup>2</sup> |    | 90分           |
| ⑥ 生食        | 50mL                 | 1本 | 抜針用           |

Day15・29

|             |                      |    |     |
|-------------|----------------------|----|-----|
| ① 生食        | 20mL                 | 1本 | 穿刺時 |
| ② 生食        | 100mL                |    |     |
| デキサメタゾン     | 9.9mg                |    |     |
| グラニセトロン     | 3mg                  |    | 30分 |
| ③ 生食        | 250mL                |    |     |
| イリノテカン(カプト) | 150mg/m <sup>2</sup> |    | 90分 |
| ④ 生食        | 50mL                 | 1本 | 抜針用 |

Day22

|         |                  |    |               |
|---------|------------------|----|---------------|
| ① 生食    | 20mL             | 1本 | 穿刺用           |
| ② 生食    | 50mL             |    | ハーセプチン投与までの維持 |
| ③ 生食    | 250mL            |    |               |
| トラスズツマブ | 6mg/kg (2回目投与以降) |    | 30分 (2回目投与以降) |
| ④ 生食    | 50mL             | 1本 | 抜針用           |

<内服>

Day2・3

Day16・17

Day30・31

|                   |     |    |    |
|-------------------|-----|----|----|
| ① デキサメタゾン (デカドロン) | 8mg | 分2 | 朝昼 |
|-------------------|-----|----|----|