

レジメン名：R2 療法

悪性リンパ腫

催吐リスク：低度

処方： 1クール 4週間

<点滴>

1クール目 Day1・8・15・22

(① '生食	20mL	ポート穿刺時 )
① 生食	100mL	血管確保
② 生食	mL	10 倍に希釈調製
リツキシマブ(リツサ)	375mg/m <sup>2</sup>	初回投与は 25mL/h から開始 1 時間後副作用なければ 100mL/h さらに 1 時間後に 200mL/h 2クール目以降初回副作用なければ 100mL/h から開始 1 時間後副作用なければ 200mL/h

2~5クール目 Day1

(① '生食	20mL	ポート穿刺時 )
① 生食	100mL	血管確保
② 生食	mL	10 倍に希釈調製
リツキシマブ(リツサ)	375mg/m <sup>2</sup>	2クール目以降初回副作用なければ 100mL/h から開始 1 時間後副作用なければ 200mL/h

<内服>

1クール目

Day1・8・15・22

① ロキソプロフェン 60mg	1錠	
ポララミン 2mg	1錠	リツキサン投与 30 分前

Day1~21

② レナリドミド (ブレミド)	20mg/日	1日1回内服 (適宜減量)
-----------------	--------	---------------

2~5クール目

Day1

① ロキソプロフェン 60mg	1錠	
ポララミン 2mg	1錠	リツキサン投与 30 分前

Day1~21

② レナリドミド (ブレミド)	20mg/日	1日1回内服 (適宜減量)
-----------------	--------	---------------