

レジメン名：SOX+Pmab 療法

大腸がん

催吐リスク：中等度

処方：1クール 3週間

<点滴> 末梢静脈

Day1

- | | | | | |
|---|------------------|----------------------|--------|-----------------------|
| ① | 5%ブドウ糖 | 100mL | | |
| | デキサメタゾン | 9.9mg | | |
| | グラニセトロン | 3mg | 30分 | |
| ② | 生食 | mL | | |
| | パニツムマブ (ハネ化マブ) | 6mg/kg | 1時間 | |
| | | | | 全量 100mL となるように生食を加える |
| ③ | 5%ブドウ糖 | 250mL | | |
| | オキサリプラチン(エルプラット) | 130mg/m ² | 2時間 | |
| ④ | 生食 | 50mL | フラッシュ用 | 10分くらい |

<点滴> Vポート静脈内抗癌剤持続注入

Day1

- | | | | | |
|---|------------------|----------------------|-----|-----------------------|
| ① | 生食 | 20mL | 1本 | 穿刺用 |
| ② | 5%ブドウ糖 | 100mL | | |
| | デキサメタゾン | 9.9mg | | |
| | グラニセトロン | 3mg | 30分 | |
| ③ | 生食 | mL | | |
| | パニツムマブ (ハネ化マブ) | 6mg/kg | 1時間 | |
| | | | | 全量 100mL となるように生食を加える |
| ④ | 5%ブドウ糖 | 250mL | | |
| | オキサリプラチン(エルプラット) | 130mg/m ² | 2時間 | |
| ⑤ | 生食 | 20mL | 1本 | 抜針用 |

<内服>

Day1-14

- | | | | | |
|---|------|-------------------|----|--|
| ① | TS-1 | mg/m ² | 分2 | 朝夕 |
| | | | | Day1 夕-Day15 朝 内服 |
| | | | | Day15 夕-Day22 朝 休薬 |
| | | | | 1.25 m ² 未満 80mg/日 |
| | | | | 1.25 m ² 以上 1.5 m ² 未満 100mg/日 |
| | | | | 1.5 m ² 以上 120mg/日 |

Day2-3

- | | | | | |
|---|-----------------|-----|----|----|
| ② | デキサメタゾン (デカドロン) | 8mg | 分2 | 朝昼 |
|---|-----------------|-----|----|----|