

レジメン名：Atezolizumab+VP-16+CBDCA 療法 小細胞肺癌  
 催吐リスク：中等度

処方： 1クール 3週間

導入療法(1~4クール)

<点滴>

Day1

① 生食	50mL	15分	
② 生食	100mL		
アテゾリズマブ (セトリク)	1200mg	初回	60分
		2回目以降	30分
		インラインフィルター使用	
		フラッシュ用	10分くらい
③ 生食	50mL		
④ 生食	100mL		
デキサメタゾン	9.9mg		
グラニセトロン	3mg	30分	
⑤ 5%ブドウ糖	500mL		
エトポシド	100mg/m <sup>2</sup>	90分	
⑥ 生食	250mL		
カルボプラチン	AUC5	60分	
⑦ 生食	50mL	フラッシュ用	10分くらい

Day2-3

① 生食	50mL	15分	
② 生食	100mL		
デキサメタゾン	6.6mg	30分	
③ 5%ブドウ糖	500mL		
エトポシド	100mg/m <sup>2</sup>	90分	
④ 生食	50mL	フラッシュ用	10分くらい

<内服>

Day1

① アプレピタント(イマド)	125mg	抗がん剤投与 60-90分前
----------------	-------	----------------

Day2.3

② アプレピタント(イマド)	80mg	分1 朝
----------------	------	------

2枚目に続く

維持療法(5カール～)

<点滴>

Day1

① 生食	50mL	15分
② 生食	100mL	
アテゾリズマブ (セクトリク)	1200mg	初回 60分 2回目以降 30分
		インラインフィルター使用
③ 生食	50mL	フラッシュ用 10分くらい