

レジメン名：R-GDP 療法

悪性リンパ腫

催吐リスク：高度

処方： 1クール 3週間

<点滴>

Day1

(① '生食	20mL	ポート穿刺時)
① 生食	1000mL	
硫酸 Mg 補正液	20mL	
KCL 注 20mEq キット	20mL	180 分
② 生食	100mL	
グラニセトロン	3mg	
デカドロン	33mg	15 分
③ 生食	100mL	
ゲムシタピン (ジイザール)	1000mg/m ²	30 分
④ マンニトール	300mL	30 分
⑤ 生食	500mL	
シスプラチン	75mg/m ²	60 分
⑥ 生食	500mL	60 分

Day8

(① '生食	20mL	ポート穿刺時)
① 生食	100mL	ルート確保用
		GEM 終了後フラッシュとして使用
②生食	mL	10 倍に希釈調製
リツキシマブ(リツサ)	375mg/m ²	初回投与は 30 分間 50mL/h で開始
		副作用なければ 30 分毎に 50mL/h 上げて
		最大 400mL/h まで上げられる
		2クール目以降初回副作用なければ 100mL/h から開始
		副作用なければ 30 分毎に 100mL/h 上げて
		最大 400mL/h まで上げられる
③ 生食	100mL	
グラニセトロン	3mg	15 分
④ 生食	100mL	
ゲムシタピン (ジイザール)	1000mg/m ²	30 分

<内服>

Day1

①アプレピタント 125mg

Day2~3

①アプレピタント 80mg

Day2~4

① レナデックス (デキサメタゾン) 4mg 10錠

Day8

① ロキソプロフェン 60mg 1錠 リツキサン投与 30 分前
 ポララミン 2mg 1錠