

レジメン名：XELOX (Capecitabine+L-OHP) +Bmab 療法 大腸がん
 催吐リスク：中等度

処方： 1クール 3週間

<点滴> 末梢静脈

Day1

- | | | | |
|------------------|----------------------|--------|--------|
| ① 生食 | 100mL | | |
| デキサメタゾン | 9.9mg | | |
| グラニセトロン | 3mg | 30分 | |
| ② 生食 | 100mL | | |
| ベバシズマブ (アバスタ) | 7.5mg/kg | 初回 | 90分 |
| | | 2回目 | 60分 |
| | | 3回目以降 | 30分 |
| ③ 5%ブドウ糖 | 250mL | | |
| オキサリプラチン(エルプラット) | 130mg/m ² | 2時間 | |
| ④ 生食 | 50mL | フラッシュ用 | 10分くらい |

<点滴> Vポート静脈内抗癌剤持続注入

Day1

- | | | | |
|------------------|----------------------|-------|-----|
| ① 生食 | 20mL | 1本 | 穿刺用 |
| ② 生食 | 100mL | | |
| デキサメタゾン | 9.9mg | | |
| グラニセトロン | 3mg | 30分 | |
| ③ 生食 | 100mL | | |
| ベバシズマブ (アバスタ) | 7.5mg/kg | 初回 | 90分 |
| | | 2回目 | 60分 |
| | | 3回目以降 | 30分 |
| ④ 5%ブドウ糖 | 250mL | | |
| オキサリプラチン(エルプラット) | 130mg/m ² | 2時間 | |
| ⑤ 生食 | 20mL | 1本 | 抜針用 |

<内服>

Day1-14

- | | | | |
|----------------|-----------------------|-----------------|------|
| ① カペシタピン (ゼロダ) | 2000mg/m ² | 分2朝夕 | 14日間 |
| | | Day1 夕-Day15 朝 | 内服 |
| | | Day15 夕-Day22 朝 | 休薬 |

Day2-3

- | | | | |
|-------------------|-----|------|-----|
| ② デキサメタゾン (デカドロン) | 8mg | 分2朝昼 | 2日間 |
|-------------------|-----|------|-----|